

# LÁMINAS DE HONGOS

José Cuesta Cuesta, (Ing. Técnico Forestal)  
Nino Santamaría Rodríguez, (Licenciado en Químicas)

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Amanita pantherina</i> (DC. ex Fr.) Krombh
FAMILIA	Amanitaceae
NOMBRES VULGARES	Oronja pantera
SOMBRERO	De 4 a 12 cm de diámetro. Hemisférico, después convexo, finalmente plano-convexo. De color que varía entre el pardo-grisáceo y marrón claro. Cutícula separable con facilidad, húmeda, brillante, que presenta restos membranosos del velo universal en forma de numerosas verrugas de color blanco puro dispuestas regularmente, que pueden desprenderse con facilidad. Margen redondeado, muy estriado y concoloro.
HIMENIO	Láminas libres, redondeadas y apretadas con laminillas intercaladas. De color blanco. Arista de aspecto harinoso del mismo color.
PIE	6-12 cm de largo x 0,5-2 cm de diámetro. Cilíndrico ensanchándose hacia la base, terminando en un bulbo redondeado, hueco. Inicialmente duro y firme. De color blanco, presenta aspecto harinoso en toda la superficie. Anillo blanco, a media altura, membranoso, tipo faldita, persistente y algo estriado en su parte superior. La volva es circunsisa, (terminada por un reborde en ángulo vivo), que por encima presenta dos o tres burletes anulares.
CARNE	Poco consistente, tierna, de color blanco. Olor débil, sabor dulce.
REACCIONES QUÍMICAS	Con frenol la carne da coloración púrpura que vira a marrón chocolate.
ESPORADA	Esporada blanca.
MICROSCOPIA	Esporas lisas, ovoidales, hialinas, de 10-12 x 7-8 micras. No amiloides. Basidios tetraspóricos.
ECOLOGÍA	Verano y otoño. Fructifica bajo coníferas y también bajo caducifolios.
COMESTIBILIDAD	Muy tóxica. Presenta el mismo síndrome que <i>A. muscaria</i> , (micoatropínico), pero más grave, y excepcionalmente puede ocasionar la muerte. Los síntomas consisten en excitación psicomotriz, convulsiones, estado de embriaguez, delirio, vértigos, alucinaciones, miosis, diuresis, vómitos, etc.; comienzan entre media hora y 4 horas después de la ingestión de las setas y pueden durar hasta tres días.
OBSERVACIONES	Se puede confundir con la <i>Amanita spissa</i> , que se diferencia por tener la volva napiforme, las verrugas del sombrero membranosas y el borde del sombrero no estriado. Existe una variedad típica de coníferas de montaña: var. <i>abietinum</i> Gilbert, que posee sombreros de gran tamaño, (hasta 15 cm), de color pardo oscuro.



AMANITA PANTHERINA (DC. ex Fr.) Krombh.

Autores: José Cuesta Cuesta y Nino Santamaría Rodríguez