

<b>NOMBRE CIENTIFICO:</b>	<b>HYGROCYBE COCCINEA</b> ( <i>Schff. ex. Fr.</i> ) <i>Kummer</i>
<b>FAMILIA:</b>	Hygrophoreaceae
<b>SINONIMOS:</b>	Hygrophorus coccineus (Schff. ex. Fr.) Kars
<b>NOMBRES VULGARES:</b>	Ezko gorri-txiki (Eus.), Kirschroter saftling (Al.)
<b>SOMBRERO:</b>	2-6 cm. ø. Hemisférico o acampanado, después plano convexo. Cutícula húmeda, no viscosa, glabra, de un bello color rojo cereza que puede decolorarse en algunas zonas a anaranjado o amarillento. Margen concoloro.
<b>HIMENIO:</b>	Láminas adnatas o escotadas. Espaciadas, de color rojo-cereza a rojo-anarajandas y con la arista amarillenta. Con laminillas y lamélulas intercaladas.
<b>PIE:</b>	0,5-1 x 4-7 cm. Cilíndrico, a veces sinuoso y comprimido longitudinalmente (asurcado), hueco, concoloro al sombrero pero más claro en la base.
<b>CARNE:</b>	Frágil, escasa, de color rojo o anaranjada. Inodora, sabor dulce y suave.
<b>ESPORAS:</b>	7-9 x 4-5 µ. Elipsoidales ligeramente constreñidas en algún caso, lisas, hialinas y no amiloides. Esporada de color blanco.
<b>MICROSCOPIA:</b>	Carece de cistidios tanto en la cara como en la arista de las láminas, Basidios tetraspóricos. Trama regular. Cutícula filamentosa.
<b>ECOLOGIA:</b>	Otoño. Entre la hierba de praderas y pastizales, o claros herbosos de los bosques. Especie rara, fructifera de forma gregaria.
<b>COMESTIBILIDAD:</b>	Sin interés culinario.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Existen varias especies próximas, de las que se distinguen por el color del sombrero, del pie y de las láminas y por la arista amarillenta de éstas. Pertenece a la sección <i>Pseudohygrocybe</i> caracterizada por la forma obtusa de sus sombreros, de superficie glabra, húmeda y no viscosa. Especies parecidas son <i>H. marchii</i> ( <i>Bres</i> ) <i>Møll.</i> que tiene el sombrero más anaranjado con el margen a menudo festoneado, <i>H. quieta</i> ( <i>Kühn.</i> ) <i>Sing.</i> más grande, anaranjado y de olor a jabón, <i>H. miniata</i> ( <i>Fr.</i> ) <i>Kummer</i> que es ligeramente escamoso-fibriloso, <i>H. coccineocrenata</i> ( <i>Orton</i> ) <i>Moser</i> , más pequeño, con pequeñas escamas oscuras y que fructifica entre briofitos higrófilos y <i>H. reae</i> ( <i>R. Mre.</i> ) <i>Lange</i> que es viscoso, de sabor amargo y sus esporas son claramente constreñidas y más anchas en la base.



**HYGROCYBE COCCINEA**