LÁMINAS DE HONGOS

José Cuesta Cuesta (Ing. Técnico Forestal)
Nino Santamaría Rodríguez (Licenciado en Químicas)

NOMBRE CIENTÍFICO	*Suillus bellini* (Inzenga) O. Kuntze
FAMILIA	*Boletaceae*
NOMBRE VULGAR	Boleto de pie moteado
SOMBRERO	De 5 a 10 (15) cm de diámetro. Hemisférico de joven, convexo a plano en la madurez. Cutícula fácilmente separable de la carne, lisa, viscosa en tiempo húmedo; su color varía del blanquecino crema-amarillento de joven, al pardo-castaño o pardo-rojizo en la madurez. Margen excedente de tonos más claros que el centro del sombrero.
TUBOS Y POROS	Tubos cortos, adnatos, incluso algo decurrentes, no separables de la carne; blanquecinos a amarillentos. Poros pequeños, angulosos; de color amarillo-pálido al principio, pasan al amarillo-oliva en la madurez; exudan pequeñas gotas que los manchan con tonos ferruginosos.
PIE	De 3 - 8 x 1 - 3 cm, corto en relación con el diámetro del sombrero, cilíndrico, macizo; en general, ligeramente más delgado hacia la base. Blanquecino, con tonos amarillos en la parte superior, al lado de los poros. Su superficie está salpicada por abundantes gránulos pardo-rojizos, característicos de esta especie.
CARNE	En el sombrero, maciza al principio, más blanda al envejecer; en el pie es más fibrosa y consistente. De color amarillo-pálido al corte, amarilla-limón junto a los tubos. Olor y sabor ligeramente afrutados.
ESPORADA	En masa de color amarillo-ocre.
MICROSCOPÍA	Esporas lisas, fusiformes, pardo-amarillentas, de 8 -10 x 4 - 5 µm. Basidios tetraspóricos. Cistidios fusiformes.
ECOLOGÍA	En la Península Ibérica crece en el área mediterránea, formando asociaciones micorrícicas con las raíces de varias especies de pino de dos acículas (*Pinus halepensis, P. pinaster* y *P. pinea*), tal y como se aprecia en la fotografía. Fructifica en grupos de numerosos ejemplares en el otoño.
COMESTIBILIDAD	Los ejemplares jóvenes son buenos comestibles, siempre que quitemos la cutícula, que puede resultar purgante.
CONFUSIÓN POSIBLE	Podría confundirse con otras especies de *Suillus* tales como *S. collinitus*, que presenta micelio rosa apreciable en la base del pie, y la cutícula con fibras radiales más oscuras; con *S. granulatus*, que tiene el pie más largo con granulación menos marcada y presenta una la cutícula con tonos más oscuros y uniformes. Por último, la especie con la que presenta mayor similitud es con *S. meditarreneensis*, del que se diferencia por el hábitat más termófilo de este último (crece a menor altitud, y por lo tanto en ambientes más cercanos al mar), por no presentar nunca cutícula blanca, y por ser la carne siempre amarilla más intensa en el pie.
OBSERVACIONES	Especie de distribución mediterránea, aunque es capaz de fructificar lejos del litoral, como el ejemplar reflejado en la fotografía, que fue recogido en una masa mixta de *P. pinaster* y *P. pinea* en el municipio de Cadalso de los Vidrios (Madrid).

Suillus bellini (Inzenga) O. Kuntze

Autores: José Cuesta Cuesta y Nino Santamaría Rodríguez