

# LÁMINAS DE HONGOS

José Cuesta Cuesta, (Ing. Técnico Forestal)  
Nino Santamaría Rodríguez, (Licenciado en Químicas)

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Amanita vittadinii</i> (Moreti) Vittadini
FAMILIA	<i>Amanitaceae</i>
SOMBRERO	De 7 a 15 cm. Hemisférico a plano convexo en la madurez. De color blanco o crema, ocráceo al envejecer. Cutícula separable de la carne del sombrero, que presenta restos del velo general en forma de abundantes escamas piramidales blancas. Margen incurvado, excedente y apendiculado (con restos de velo), no estriado.
LÁMINAS	Libres, apretadas, desiguales, con laminillas intercaladas. De color blanco y crema en la vejez. Arista finamente erodada.
PIE	De 7-20 x 1,5-3,5 cm. Cilíndrico, radicante, duro, del mismo color que el sombrero, revestido de escamas membranosas escuarras (recurvadas), que se manchan de marrón con la edad y el roce. Anillo apical, no estriado, membranoso, doble, amplio, tipo faldita, de color blanco que amarillea con el roce. Volva indiferenciada, que se reduce a escamas en la base del pie del mismo tipo que las que lo recubren en toda su longitud.
CARNE	Compacta, de color blanco, que amarillea ligeramente en la base del pie. Sabor dulce. Olor fúngido y finalmente desagradable.
ESPORADA	Crema a blanco.
MICROSCOPIA	Esporas subglobosas a anchamente elipsoidales. 8,5-9,5 x 10-12 micras, lisas, amiloides, con apículo prominente. Basidios tetraspóricos. Cutícula filamentosa. Hifas septadas y con fíbulas. Trama laminar divergente.
ECOLOGÍA	Especie rara, termófila, que fructifica en primavera y otoño en prados y jardines. Solitaria a subgregaria.
COMESTIBILIDAD	Buen comestible, pero poco abundante.
OBSERVACIONES	<i>A. vittadini</i> es una especie de amanita un tanto singular, con aspecto híbrido entre macrolepiota y armillaria, que se caracteriza por sus coloraciones blancas en todo el carpóforo y su apariencia general escamosa. Especie muy próxima es <i>Amanita codinae</i> (Mre.) Singer, que para algunos autores no es más que una forma de <i>A. vittadini</i> , de menor tamaño y esbletez. <i>A. codinae</i> presenta un pie de longitud semejante o inferior al diámetro del sombrero, mientras que en <i>A. vittadini</i> es más largo. También podría confundirse por su porte con especies del género <i>Macrolepiota</i> , que presentan coloraciones más ocráceas, que no tienen escamas escuarras en el pie y cuyos anillos suelen ser dobles y móviles.



AMANITA VITTADINII (Moreti) Vittadini

Autores: José Cuesta Cuesta y Nino Santamaría Rodríguez