

LÁMINAS DE HONGOS

José Cuesta Cuesta, (Ing. Técnico Forestal)
Nino Santamaría Rodríguez, (Licenciado en Químicas)

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Suillus flavidus</i> (Fr.: Fr.) Singer = <i>Boletus flavidus</i> Fries
FAMILIA	<i>Boletaceae</i>
NOMBRE VULGAR	Boleto con anillo gelatinoso
SOMBRERO	De 3 a 7 cm de diámetro. De joven es cónico acampanado, con mamelón obtuso; con el crecimiento se aplatana. Cutícula separable de la carne, viscosa en tiempo húmedo; su color varía del amarillo limón al amarillo pardo, con fibrillas radiales más oscuras. Margen excedente.
TUBOS Y POROS	Tubos adnatos, incluso algo decurrentes, amarillentos al principio, se van oscureciendo con el paso del tiempo, hasta alcanzar tonalidades pardas. Poros angulosos, relativamente amplios al final de su desarrollo; del mismo color que los tubos.
PIE	De 4 - 8 x 1 (1,5) cm, sinuoso, amarillo limón por encima del anillo; por debajo, pardo-amarillento. El anillo es de consistencia gelatinosa, pardo-amarillento.
CARNE	En el sombrero blanda, en el pie es más fibrosa y consistente. De color amarillo-pardo al corte. Olor y sabor ligeramente afrutados y ácidos.
ESPORADA	En masa de color amarillo-ocre.
MICROSCOPIA	Esporas lisas, elípticas, de 7,5 - 9 x 3,5 - 4,5 μ m. Basidios tetraspóricos, sin fibulas de 21 - 27 x 5 - 6 μ m. Cistidios más estrechos hacia la base.
ECOLOGÍA	En la Península crece únicamente formando asociaciones micorrícicas con las raíces del pino alba, (<i>Pinus sylvestris</i>), a partir de 1.200 m de altitud. Prefiere zonas muy húmedas, casi encharcadas, donde crece entre el <i>sphagnum</i> , (tuberas), en grupos poco numerosos o aislado. Fructifica al final del verano y al principio del otoño.
COMESTIBILIDAD	Aunque no es tóxico, debe desecharse por su nula consistencia y por su relativa dificultad para encontrarlo.
CONFUSIÓN POSIBLE	Especie con características bien definidas, aunque a veces puede confundirse con <i>S. grevillei</i> , del que se diferencia por su menor talla, por tener el anillo de consistencia distinta y por no crecer bajo alerces.
OBSERVACIONES	En España está sólo citado en la mitad norte, donde el pino albar es más abundante en todas las cadenas montañosas (Cordillera Central, Sistema Ibérico y Pirineos principalmente).



SUILLUS FLAVIDUS (Fr.: Fr.) Singer
BOLETUS FLAVIDUS Fries

Autores: José Cuesta Cuesta y Nino Santamaría Rodríguez